


### Après la pluie, le beau temps...

- Anticiper le pâturage estival
- Gérer les épis et les fauches
- Rouler les prairies

- Vaches allaitantes
- ★ Vaches allaitantes BIO
- Vaches laitières
- ☆ Vaches laitières BIO

	Croissance moyenne (kg MS/ha/jour) du 28/05 au 03/06	Hauteur moyenne (cm)
<b>Zone Nord</b>	46	10,9
<b>Zone Intermédiaire</b>	48	11,2
<b>Zone Sud</b>	<b>Nord Loire</b>	46
	<b>Sud Loire</b>	46
<b>MOYENNE REGION</b>	<b>47</b>	<b>10,5</b>



Pousse régionale au même niveau que la semaine dernière, avec tout de même quelques zones où la pousse rejoint les moyennes de saison. Il s'agit notamment des terres sableuses qui se réchauffe plus vite.

## Anticiper le pâturage estival

Les prévisions météo à partir de cette semaine présagent enfin un arrêt des pluies, et des températures avoisinant les 20°C. Cela laisse des perspectives de pâturage et de fauche. Sur la région, nous retrouvons deux cas de figures :

- Les stocks ont pu être fait au printemps et recouvrent la majorité des besoins en fourrage pour l'année. Dans ce cas-là, l'objectif sera de maximiser le pâturage avant l'arrêt de la pousse estivale.
- Les stocks n'ont pas pu être fait depuis le début d'année. L'objectif ici est d'abord de faire les stocks fourragers maintenant, pour avoir des repousses feuillues d'ici 1 mois, 1 mois et demi et allonger le pâturage sur l'été.

De manière générale, il va falloir veiller à ne pas accélérer le rythme de pâturage. Si on ne veut pas pénaliser l'allongement du pâturage en fin de printemps, il faudra bien respecter le stade 3 feuilles : l'été peut vite arriver. Pour adapter le rythme de rotation il faudra jouer sur les quantités distribuées à l'auge (enrubannage, ouverture de silos,... et en vendant les animaux improductifs) Il faudra également augmenter la hauteur sortie des paddocks à 6 cm en préparation de la période estivale.


## Gérer les épis et les fauches

Les parcelles sont globalement épiées ce qui rend difficile le pâturage efficace. Cela entraîne deux problématiques : une ingestion journalière insuffisante et des zones de refus. Deux options peuvent être mises en place : fauche des refus après le passage des animaux ou faire un topping. Pour le topping il est conseillé de faucher la veille ou à minima de laisser 12h de préfanage après la fauche pour augmenter l'appétence, mais pas plus de 24h pour éviter une trop grande perte de valeur alimentaire.

Beaucoup de sols restent encore humides, garder une vigilance sur le séchage si des travaux de foin sont prévus. Les 6 premières heures de séchage sont les plus importantes. Il est possible d'attendre 24h avant de faner les andains, afin d'éviter un maintien de l'humidité sur-sous l'herbe fauchée.

## Rouler les prairies

Les conditions de pâturage n'étant pas été optimales depuis le début de l'année, beaucoup de prairies présentent encore des marques de piétinement. Il est encore possible de rouler certaines prairies, à condition que le sol soit ressuyé, mais pas séchant.



Bulletin pousse de l'herbe Pays de la Loire, une action partenariale :

**Chambre d'agriculture Pays de la Loire** 02 53 46 62 28 [www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr](http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr)

**SEENOVIA** 02 43 64 12 64 [www.seenovia.fr](http://www.seenovia.fr)